

Qué hacer si mi hijo presenta síntomas de sospecha de COVID-19




No acudir al centro educativo, independientemente del estado de vacunación.

Aislarse en casa, en una habitación **bien ventilada**



Restringir al máximo las salidas de la habitación y **evitar el contacto con los convivientes**



Si no se puede evitar interactuar con convivientes, se debe usar, **siempre que se pueda, mascarilla quirúrgica/FFP2 y ventilar el espacio.** Es importante evitar interactuar con personas vulnerables.



Se debe de contactar con la línea 900 112 061 para notificar que presenta síntomas de sospecha y seguir las instrucciones indicadas.



Qué hacer si mi hijo presenta síntomas de sospecha de COVID-19



En la mayoría de los casos los **síntomas son leves**, sobre todo en personas vacunadas. Los más frecuentes son: fiebre, secreción o congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, síntomas intestinales, dolores musculares, tos, pérdida del olfato y pérdida del gusto.

Se deberá permanecer en aislamiento hasta tener **un resultado de una prueba diagnóstica negativa**. En el caso de no poder realizarla, deberá mantener el aislamiento un tiempo mínimo de 7 días y siempre asegurando que hayan transcurrido 3 días sin síntomas antes de la vuelta al centro educativo.



En caso de presentar síntomas, un auto-test diagnóstico de farmacia **no descarta la enfermedad, ni es válido para levantar el aislamiento preventivo**.

Durante el aislamiento, **vigilar la aparición de síntomas de alarma** tales como dificultad para respirar, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, dolor o presión persistente en el pecho.



En caso de que aparezcan **síntomas de alarma, llamar al 112** e identificar a la persona como sospechosa de COVID-19.